

# 消化性潰瘍飲食

國泰綜合醫院營養組編印 著作權人：國泰綜合醫院  
本著作非經著作權人同意，不得轉載、翻印或轉售

## ■ 治療飲食的目的

消化性潰瘍是指消化道受到胃液的腐蝕，造成黏膜產生糜爛的現象，常見的消化性潰瘍以十二指腸潰瘍居多，其次是胃潰瘍。

本飲食使病人腸黏膜恢復正常，提升營養素的消化吸收。

## ■ 飲食的原則

- 細嚼慢嚥，進餐時儘量放鬆，餐後略作休息。
- 定時定量，少量多餐。
- 不要單純吃澱粉類食物，每餐最好含有蛋白質、脂肪的食物，如：奶、蛋、肉、魚類、豆製品等。
- 產氣性食物容易使人脹氣，應避免攝食。
- 減少攝取不易消化的食物，如：炒飯、烤肉等太油的食物；年糕、粽子等糯米類製品；各式糕餅及油炸的食物。

- 避免刺激性食物，如：咖啡、酒、濃茶、肉汁、辣椒、芥茉、胡椒及冰品類等，這些食物會刺激胃液分泌或是使胃黏膜受損。
- 生活規律，不要熬夜，減少無謂的煩惱，心情保持愉快。
- 不抽菸、不喝酒。

為了健康，請繼續飲食控制。如果想要了解飲食方面相關知識，或有任何疑問，請洽

國泰綜合醫院	(02)27082121	轉 1681
內湖國泰診所	(02)87972121	轉 712
新竹國泰綜合醫院	(03)5278999	轉 2250
汐止國泰綜合醫院	(02)26482121	轉 8822

☺ 國泰綜合醫院 營養組 關心您 ☺

A2400.072.2009.04 二修