

經皮內視鏡胃造瘻術

一、何謂經皮內視鏡胃造瘻術？

藉由內視鏡的輔助，穿透腹壁的皮膚進入胃部製造一個人工的餵食管，即為經皮內視鏡胃造瘻術。主要適用來灌食以提供營養，必要時可經此管路抽取胃內容物或減輕胃脹不適。



二、適應症

1. 食道癌或腐蝕性化學灼傷引起食道狹窄或阻塞者。
2. 食道與胃接觸的賁門癌或賁門狹窄、阻塞者。
3. 有吞嚥困難情形或無法由口腔進食者。
4. 吸入性肺炎高危險群。

三、胃造瘻口要如何照顧？

1. 平日傷口部位不需消毒，可沖澡，以棉花棒擦乾傷口部位後墊上乾淨紗布即可，周圍皮膚可擦凡士林保護皮膚。
2. 管子周圍紗布，不需常更換；有分泌物流出而導致紗布潮濕時再更換。
3. 每天觀察傷口，傷口若有紅腫、壓痛或不正常分泌物、外漏或病人出現發燒現象，請立即返院告知醫師。

四、灌食注意事項

1. 經皮內視鏡胃造瘻術後，請禁食 18 小時。
2. 18 小時後（即術後隔天早上）請開始少量灌食。首先，以 50c.c. 溫開水灌食，若無外漏或不適即可開始以每 2 小時 50-100c.c. 灌食流質飲食。一天後，每 4 小時灌食 150-200 c.c.。二天後即可每天正常灌食 3-4 次。
3. 每次灌食之前務必回抽，若超過 50c.c. 請停止餵食一次後，從少量開時餵食。
4. 灌食的食物先用果汁機打碎，再以紗布過濾渣質再灌，速度不要太快，每次灌食前後請以 30-60 c.c. 溫開水沖灌管子。灌食後請記得關緊蓋子，防止食物逆流出來。

著作權人：內湖國泰診所
本著作非經著作權人同意，
不得轉載、翻印或轉售



※若有任何疑問，請洽內視鏡室

電話：(02) 87972121

轉 620-621。

內湖國泰診所 關心您